

BONPARD® COLON

Aliment complémentaire diététique pour chevaux en compensation des troubles digestifs chroniques du gros intestin.

Pour la colique gazeuse et pour les chevaux atteints de fourbure chronique. La colique d'origine gazeuse du gros intestin et la fourbure chronique sont des pathologies qui peuvent être induites par un trouble digestif chronique du cæcum et du gros intestin. Des crottins mal digérés ou des fèces trop liquides sont souvent des signes d'une pathologie digestive du cæcum et du gros intestin. Aussi, dans ces situations, **Bonpard Colon** peut être bénéfique.

Stabilise et favorise la fermentation dans le cæcum et le gros intestin. Une bonne fermentation dans le cæcum et le gros intestin est essentielle pour la santé du cheval. Le large éventail de fibres contenues dans **Bonpard Colon** entretient la flore intestinale naturelle, posant les bases d'une fermentation saine. Les levures contribuent à éviter une acidification du contenu intestinal. Si celui-ci devient trop acide, les "bonnes" bactéries de la flore intestinale meurent en premier.

La faible teneur en protéines et en amidon, ainsi que les sources prétraitées (précuites) d'amidon assurent une digestion efficace dans l'intestin grêle, afin que les bons nutriments parviennent dans le cæcum et le gros intestin.

Bonpard Colon est un aliment riche en fibres et à faible teneur en amidon et en glucides. Il s'utilise en combinaison avec du foin grossier ou de l'ensilage. La composition de **Bonpard Colon** a été étudiée avec soin et fournit tous les nutriments essentiels, notamment les minéraux et vitamines dont le cheval a besoin dans ces situations.

De nombreux chevaux nécessiteront un régime alimentaire diététique à long terme, voire à vie. La durée d'utilisation initiale est de 6 mois maximum. Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant le démarrage ou la prolongation du régime. Tous les aliments diététiques Bonpard sont appropriés à une utilisation à vie.

Les aliments pour chevaux Bonpard sont exclusivement disponibles chez le vétérinaire.

BONPARD® COLON



Bonpard Colon convient en cas de colique du gros intestin, de fourbure ou de crottins mal digérés. Il a été spécialement conçu pour une fermentation saine du cæcum et du gros intestin. La combinaison d'une sélection de fibres favorise la mastication et soutient une digestion optimale dans l'intestin grêle.

Caractéristiques:

- très faible teneur en glucides et en amidon
- riche combinaison de fibres
- faible teneur en protéines
- contient des levures vivantes

Comment utiliser Bonpard Colon?

Les aliments diététiques sont adaptés au cheval et à la situation. Votre vétérinaire examinera votre cheval et prescrira un régime alimentaire détaillé, incluant l'apport fourrager et la fréquence des repas. Demandez conseil à votre vétérinaire pour toute question sur votre cheval ou son alimentation.

Votre cheval ou poney: Poids vif¹:

Vétérinaire traitant:

Prochain rendez-vous:

¹ **Poids du cheval:** le poids idéal de votre cheval/poney peut être différent de son poids actuel, mais reste néanmoins le poids de référence pour le régime.

Ration (date:))

	Bonpard Colon	Foin (1)	Ensilage (2)	Pâturage (3)
Votre cheval/poney: kg kg kg heures

Donnez au moins 4 portions de foin et 2 portions de Bonpard Colon par jour (le foin et l'aliment peuvent être donnés en même temps). Assurez-vous que votre animal ne reste jamais sans manger plus de six heures.

Calculer la composition de la ration avec foin (base):

Déterminez dans quelle catégorie se classe votre cheval ou poney, et calculez sa ration journalière. Consultez la table de conversion si vous voulez donner de l'ensilage ou de l'herbe au lieu du foin.

Poids du cheval	Niveau de travail ²	Par 100 kg de poids vif		Votre cheval/poney:	
		Bonpard Colon	Foin grossier frais	Bonpard Colon	Foin
< 250 kg	repos	480 g	1,3 kg		
	léger	500 g	1,7 kg		
	moyen	600 g	1,9 kg
	intensif	700 g	2,0 kg
250-450 kg	repos	400 g	1,2 kg		
	léger	500 g	1,5 kg		
	moyen	550 g	1,7 kg
	intensif	600 g	1,7 kg
	très intensif	900 g	2,0 kg
> 450 kg	repos	350 g	1,1 kg		
	léger	450 g	1,4 kg		
	moyen	500 g	1,5 kg
	intensif	550 g	1,6 kg
	très intensif	750 g	2,0 kg

² Estimez le niveau de travail moyen par semaine, en incluant les jours de repos!

Avvertissement: Des modifications par rapport aux conseils d'alimentation peuvent annuler l'effet bénéfique.

Herbe ou ensilage?

Commencez toujours avec une ration contenant du foin, donc sans ensilage ni herbe. Si les signes cliniques se sont nettement améliorés, l'herbe ou l'ensilage peut être progressivement introduit dans la ration en remplacement du foin (voir table de conversion). Chez les chevaux présentant une perturbation de la flore intestinale, une fourbure chronique et/ou une résistance à l'insuline, la partie fourragère doit toujours contenir au moins 50% de foin (matière sèche). En cas d'ulcères gastriques seulement, l'herbe peut représenter 100% de l'apport fourrager.

Quelle quantité d'ensilage remplace 1 kg de foin?

Ensilage (% de matière sèche):	60%	70%	75%
	Ensilage assez humide pour chevaux	Ensilage pour chevaux	Ensilage sec pour chevaux
1 kg de foin peut être remplacé par:	1,4 kg d'ensilage	1,2 kg d'ensilage	1,1 kg d'ensilage

Tableau de conversion pour remplacer le foin par de l'herbe (pâturage):

	1 heure de pâturage		2 heures de pâturage		3 heures de pâturage	
	repos	travail	repos	travail	repos	travail
Petit poney	45%	35%	-	-	-	-
Grand poney	30%	25%	-	50%	-	-
Cheval	20%	15%	40%	30%	-	50%

Table de transition de l'aliment actuel vers Bonpard Colon:

	Ration actuelle	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3 (nouvelle ration)
Concentré actuel kg	60%: kg	30%: kg	-
Fourrage actuel (si différent de la nouvelle ration) kg	60%: kg	30%: kg	-
..... kg	60%: kg	30%: kg	-
..... kg	60%: kg	30%: kg	-
Bonpard Colon	-	30%: kg	60%: kg	100%:
Foin grossier frais	-	30%: kg	60%: kg	100%:

Informations supplémentaires:

- Accrochez une pierre à sel dans le box de votre cheval.
- Ne donnez pas de suppléments ou additifs nutritionnels, sauf sur prescription de votre vétérinaire.
- Pesez la quantité d'une pelle à aliment Bonpard sur une balance de cuisine. Notez sur la pelle la quantité d'une portion.
- Il est important de respecter les quantités à donner: pesez le foin tous les trois mois à l'aide d'un pèse-personne ou d'un peson (filet à foin). Faites-le également en début de saison, à l'entame d'un nouveau lot de foin ou lors d'un changement de personnel.
- Vérifiez l'emballage à réception. **Date limite de consommation:** jusqu'à six mois après la date de fabrication (voir emballage). **Conditions de stockage:** dans un endroit frais et sec.