

BONPARD® MOTILITY

Aliment complémentaire diététique pour chevaux en compensation d'une insuffisance chronique de la fonction de l'intestin grêle.

Lors de coliques de constipation répétées et de crottins durs.

Une motilité intestinale insuffisante peut entraîner un ralentissement du transit intestinal, provoquant une colique de constipation et des crottins trop durs. **Bonpard Motility** a été spécialement formulé pour favoriser le transit et une bonne digestibilité dans l'intestin grêle. Des fibres spécialement sélectionnées favorisent la motilité intestinale et accélèrent la fermentation. Cela assure un bon transit des aliments et évite la constipation. De plus, **Bonpard Motility** présente une haute capacité de rétention de l'eau, de sorte que le contenu intestinal se dessèche et ralentit moins facilement.


Pour un meilleur fonctionnement des intestins. Les ingrédients de **Bonpard Motility** ont été prétraités (précuits) afin que les enzymes de l'intestin grêle puissent les décomposer plus rapidement. Si l'intestin grêle digère la grande majorité des aliments, il n'en reste plus beaucoup qui risquent de provoquer une constipation dans le gros intestin. Le son contenu dans **Bonpard Motility** favorise la motilité intestinale et donc aussi le mélange de l'aliment avec les enzymes digestives. Les levures vivantes facilitent la dégradation des fibres dans le cæcum et dans le gros intestin. Combiné avec du foin fin et doux, **Bonpard Motility** forme une ration complète et rapidement digestible.

Commencer avec un diagnostic. Les coliques peuvent avoir de nombreuses causes. Votre vétérinaire est le mieux placé pour déterminer l'origine des troubles de santé de votre cheval, afin de décider ensuite quel traitement et quelles adaptations alimentaires sont nécessaires.

De nombreux chevaux auront besoin d'une alimentation diététique à long terme, voire à vie. La durée d'utilisation initiale est de 6 mois maximum. Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant le démarrage ou la prolongation du régime. Tous les aliments pour chevaux Bonpard sont appropriés à une utilisation à vie.

Les aliments pour chevaux Bonpard sont exclusivement disponibles chez le vétérinaire.

BONPARD® MOTILITY



Bonpard Motility convient en cas de coliques provoquées par des constipations, de motilité insuffisante et de ralentissement du transit. Il favorise une bonne digestion et un bon transit sur toute la longueur des intestins. Cela contribue à la prévention des coliques de constipation.

Caractéristiques:

- matières premières prétraitées (précuites)
- digestibilité optimale
- teneur élevée en fibres spécialement sélectionnées
- contient des levures vivantes

Comment utiliser Bonpard Motility?

Les aliments diététiques sont adaptés au cheval et à la situation. Votre vétérinaire examinera votre cheval et prescrira un régime alimentaire détaillé, incluant l'apport fourrager et la fréquence des repas. Demandez conseil à votre vétérinaire pour toute question sur votre cheval ou son alimentation.

Votre cheval ou poney: Poids vif1:
 Vétérinaire traitant:
 Prochain rendez-vous:

¹ *Poids du cheval: le poids idéal de votre cheval/poney peut être différent de son poids actuel, mais reste néanmoins le poids de référence pour le régime.*

Ration (date:)

	Bonpard Motility	Foin (1)	Ensilage (2)	Pâturage (3)
Votre cheval/poney: kg kg kg heures

Donnez au moins 4 portions de foin et 2 portions de Bonpard Motility par jour (le foin et l'aliment peuvent être donnés en même temps). Assurez-vous que votre animal ne reste jamais sans manger plus de six heures.

Calculer la composition de la ration avec foin (base):

Déterminez dans quelle catégorie se classe votre cheval ou poney, et calculez sa ration journalière. Consultez la table de conversion si vous voulez donner de l'ensilage ou de l'herbe au lieu du foin.

Poids du cheval	Niveau de travail ²	Par 100 kg de poids vif		Votre cheval/poney:	
		Bonpard Motility	Foin fin, doux et frais	Bonpard Motility	Foin
< 250 kg	repos	550 g	1,1 kg		
	léger	650 g	1,2 kg		
	moyen	750 g	1,4 kg		
	intensif	800 g	1,5 kg		
250-450 kg	repos	450 g	1,0 kg		
	léger	600 g	1,3 kg		
	moyen	650 g	1,4 kg		
	intensif	700 g	1,4 kg		
> 450 kg	très intensif	1000 g	1,8 kg		
	repos	400 g	0,9 kg		
	léger	500 g	1,1 kg		
	moyen	550 g	1,2 kg		
	intensif	650 g	1,3 kg		
	très intensif	900 g	1,8 kg		

² *Estimez le niveau de travail moyen par semaine, en incluant les jours de repos!*

Quelle quantité d'ensilage remplace 1 kg de foin?

Ensilage (% de matière sèche):	60%	70%	75%
	<i>Ensilage assez humide pour chevaux</i>	<i>Ensilage pour chevaux</i>	<i>Ensilage sec pour chevaux</i>
1 kg de foin peut être remplacé par:	1,4 kg d'ensilage	1,2 kg d'ensilage	1,1 kg d'ensilage

Tableau de conversion pour remplacer le foin par de l'herbe (pâturage):

L'herbe accélère la fermentation et peut remplacer le foin.

	1 heure	2 heures	3 heures	4 heures	5 heures	6 heures
Cheval au repos ou grand poney au travail	25%	50%	75%	95%	-	-
Cheval au travail	20%	35%	55%	70%	90%	100%
Grand poney au repos ou petit poney au travail	35%	65%	90%	-	-	-
Petit poney au repos	45%	90%	-	-	-	-

Table de transition de l'aliment actuel vers Bonpard Motility:

	Ration actuelle	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3 (nouvelle ration)
Concentré actuel kg	60%: kg	30%: kg	-
Fourrage actuel (si différent de la nouvelle ration)				
..... kg kg	60%: kg	30%: kg	-
..... kg kg	60%: kg	30%: kg	-
Bonpard Motility	-	30%: kg	60%: kg	100%:
Foin fin et doux	-	30%: kg	60%: kg	100%:

Informations supplémentaires:

- De nombreux chevaux auront besoin d'une alimentation diététique à long terme, voire à vie. Tous les aliments Bonpard sont appropriés à une utilisation à vie.
- Accrochez une pierre à sel dans le box de votre cheval.
- Ne donnez pas de suppléments ou additifs nutritionnels, sauf sur prescription de votre vétérinaire.
- Pesez la quantité d'une pelle à aliment Bonpard sur une balance de cuisine. Notez sur la pelle la quantité d'une portion.
- Il est important de respecter les quantités à donner: pesez le foin tous les trois mois à l'aide d'un pèse-personne ou d'un peson (filet à foin). Faites-le également en début de saison, à l'entame d'un nouveau lot de foin ou lors d'un changement de personnel.
- Vérifiez l'emballage à réception. **Date limite de consommation:** jusqu'à six mois après la date de fabrication (voir emballage). **Conditions de stockage:** dans un endroit frais et sec.

Avertissement: Des modifications par rapport aux conseils d'alimentation peuvent annuler l'effet bénéfique.