

# BONPARD® COLON

Aanvullend dieetvoeder voor paarden ter compensatie van chronische spijsverteringsstoornissen in de dikke darm.

## Voor koliek door gasophoping en voor paarden met chronische

**hoefbevangenheid.** Zowel koliek door gasophoping in de dikke darm als chronische hoefbevangenheid zijn aandoeningen die het gevolg kunnen zijn van een chronische spijsverteringsstoornis in de blinde en dikke darm. Slecht verteerde mest of veel water bij de mest zijn meestal ook symptomen van een spijsverteringsstoornis in de blinde en dikke darm. Ook voor deze situaties is **Bonpard Colon** geschikt.

## Stabiliseert en bevordert de fermentatie in de blinde en dikke darm.

Een gezonde blinde en dikke darmfermentatie is essentieel voor de gezondheid van een paard. Het rijke assortiment aan vezels in **Bonpard Colon** stimuleert de natuurlijke darmflora, wat de basis legt voor een gezonde fermentatie. De levende gistcellen helpen verzuring van de darminhoud te voorkomen. Als de darminhoud te zuur wordt, sterven de "goede" bacteriën in de darmflora als eerste af.


Het lage eiwit- en zetmeelgehalte en de voorbehandelde (ontsloten) zetmeelbronnen zorgen voor een efficiënte dunne darmvertering, zodat de juiste voedingsstoffen in de blinde en dikke darm komen.

**Bonpard Colon** is een vezelrijk voer en heeft een laag zetmeel- en suikergehalte. U voert het in combinatie met grofstengelig hooi of kuilvoer. Een rantsoen met **Bonpard Colon** is zorgvuldig samengesteld en levert alle noodzakelijke voedingsstoffen, met ruime aandacht voor mineralen en vitamines die het paard in deze situatie nodig heeft.

Bij veel paarden zal een langdurige dieetvoeding noodzakelijk zijn, soms zelfs levenslang. De aanbevolen gebruiksduur is aanvankelijk ten hoogste 6 maanden. Aangeraden wordt om voor gebruik of voor verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen. Alle Bonpard dieetvoerders zijn geschikt voor levenslang gebruik.

Bonpard paardenvoeders zijn alleen verkrijgbaar bij de dierenarts.

# BONPARD® COLON



**Bonpard Colon** is geschikt bij dikke darmkoliek, hoefbevangenheid en slecht verteerde mest. Het is speciaal ontwikkeld voor een gezonde blinde en dikke darmfermentatie. De uitgekiende combinatie van vezels stimuleert het kauwen en ondersteunt een optimale dunne darmvertering.

### Kenmerken:

- zeer laag suiker- en zetmeelgehalte
- rijk assortiment aan vezels
- laag eiwitgehalte
- bevat levende gistcellen

# Zó voer je Colon

Dieetvoeding is afgestemd op het paard en op de situatie. Uw dierenarts controleert uw paard en geeft u een uitgebreid voeradvies, waarbij hij of zij ook het ruwvoer meeneemt en de tijden van voeren. De dierenarts is uw aanspreekpunt en vraagbaak als u uw paard of de voeding niet vertrouwt.

Uw paard of pony: ..... Gewicht!: .....

Begeleidend dierenarts: .....

Volgende afspraak: .....

<sup>1</sup> *Gewicht van het paard: het ideale gewicht van uw paard/pony kan afwijken van het huidige gewicht, maar is wel het uitgangspunt voor het voerschema.*

## Rantsoen (datum: .....)

	Bonpard Colon	Hooi (1)	Kuilvoer (2)	Weidegang (3)
Uw paard/pony:	..... kg	..... kg	..... kg	..... uur

*Voer dagelijks minimaal 4 porties hooi en 2 porties Bonpard Colon (Bonpard Colon en hooi mag tegelijk). Zorg dat uw dier nooit langer dan 6 uur geen eten heeft.*

## Rekenwijzer rantsoensamenstelling met hooi (basis):

Kijk in welke categorie uw paard of pony valt en bereken de dagelijkse voergift. Zie de omrekeningstabel, als u in plaats van hooi, kuilvoer of gras wil voeren.

Gewicht paard	Werkniveau <sup>2</sup>	Per 100 kg lichaamsgewicht		Uw paard/pony:	
		Bonpard Colon	Grofstengelig-fris hooi	Bonpard Colon	Hooi
< 250 kg	rust	480 g	1,3 kg		
	licht	500 g	1,7 kg		
	matig	600 g	1,9 kg	.....	.....
	zwaar	700 g	2,0 kg	.....	.....
250-450 kg	rust	400 g	1,2 kg		
	licht	500 g	1,5 kg		
	matig	550 g	1,7 kg	.....	.....
	zwaar	600 g	1,7 kg	.....	.....
	zeer zwaar	900 g	2,0 kg	.....	.....
> 450 kg	rust	350 g	1,1 kg		
	licht	450 g	1,4 kg		
	matig	500 g	1,5 kg	.....	.....
	zwaar	550 g	1,6 kg	.....	.....
	zeer zwaar	750 g	2,0 kg	.....	.....

<sup>2</sup> *Schat het gemiddelde werkniveau per week, dus inclusief rustdagen!*

**Disclaimer:** Afwijkingen van het voeradvies kunnen de positieve werking teniet doen.

## Gras of kuilvoer:

Begin altijd met een rantsoen met hooi, dus geen kuilvoer of gras. Als de klachten duidelijk verbeterd zijn, mag u gras of kuilvoer voorzichtig in het rantsoen introduceren, uitgewisseld tegen hooi (zie omrekeningstabel). Het ruwvoer van paarden met verstoring van de darmflora, chronische hoofbevangenheid en/of insuline resistentie moet altijd voor minimaal 50% uit hooi bestaan (op droge stofbasis). Alleen voor paarden met maagzweren mag het ruwvoer voor 100% uit gras bestaan.

## Hoeveel kg kuilvoer vervangt 1 kg hooi?:

Drogestofgehalte kuilvoer:	60%	70%	75%
	behoorlijk natte paardenkuilvoer	paardenkuilvoer	droge paardenkuilvoer
1 kg hooi wordt:	1,4 kg kuilvoer	1,2 kg kuilvoer	1,1 kg kuilvoer

## Omrekeningstabel vervanging hooi door gras (weidegang):

	1 uur weidegang		2 uur weidegang		3 uur weidegang	
	rust	werk	rust	werk	rust	werk
Kleine pony	45%	35%	–	–	–	–
Grote pony	30%	25%	–	50%	–	–
Paard	20%	15%	40%	30%	–	50%

## Overgangsschema huidig voer naar Bonpard Colon:

	Huidig rantsoen	Week 1	Week 2	Week 3 (Nieuw rantsoen)
Huidig krachtvoer	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	–
Huidig ruwvoer (indien anders dan in het nieuwe rantsoen)	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	–
..... kg	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	–
..... kg	..... kg	60%: ..... kg	30%: ..... kg	–
Bonpard Colon	–	30%: ..... kg	60%: ..... kg	100%: .....
Grofstengelig en fris hooi	–	30%: ..... kg	60%: ..... kg	100%: .....

## Extra informatie:

- Geef uw paard een zoutblok in zijn stal.
- Voer geen supplementen of toevoegingen, tenzij op voorschrift van uw dierenarts.
- Weeg Bonpard in een voerschip op een huishoudweegschaal. Markeer op de voerschip de hoeveelheid van één portie.
- Juiste hoeveelheden voeren is belangrijk dus weeg elke 3 maanden hooi op een personenweegschaal of met een unster (in een hooinet). Doe dit ook bij: begin stalseizoen, elke nieuwe partij hooi, nieuwe voerder.
- Controleer bij ontvangst de verpakking op beschadigingen. **Houdbaarheid:** zie verpakking. **Bewaarcondities:** koel en droog.