

Lokale spier- en skeletaandoeningen bij paarden




Om ze weer snel onder het zadel te helpen



De enige gel met corticosteroiden voor paarden

EKYFLOGYL

Houdt de pijn onder controle



EKYFLOGYL 1,8 mg/ml + 8,7 mg/ml GEL VOOR PAARDEN. Samenstelling: Prednisolon (als acetaat) 1,8 mg/ml, Lidocaine (als hydrochloridemonohydraat) 8,7 mg/ml, Dimethylsulfoxyde. **Indicaties:** Voor het verlichten van pijn en ontsteking samenhangend met lokale spier- en skeletaandoeningen. **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij: bekende gevallen van overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. Paarden met lever- of nierziekte. Paarden met voortschrijdende virus- of schimmelinfecties. Paarden met immunodeficiëntie. **Bijwerkingen:** Lokale reacties (pijn, hitte, haarverlies, schilfering, brandplekken, zwellingen) werden zeer zelden gemeld. **Wachtijd:** Vlees en slachtafval: 10 dagen. Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. **Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** REG NL 123503. UDA. Lees vóór gebruik de bijsluiter. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: AUDEVARD, 37-39 rue de Neuilly, 92110 CLICHY, Frankrijk.

LOKALE SPIER- EN SKELETAANDOENINGEN:

VEEL VOORKOMENDE AANDOENINGEN BIJ ALLE PAARDEN!




BOTTEN




Schiefels

PEZEN



Peesontstekingen

GEWRICHTEN



Artritis

En ook:

- **GEWRICHTSBANDEN:** *verstuiking, desmitis, enz.*
- **SPIEREN:** *verrekking, bloeditstorting, enz.*

Samenstelling

Prednisolon: 1,8 mg/ml (gelijk aan 2 mg prednisolonacetaat)

Lidocaïne: 8,7 mg/ml (als hydrochloridemonohydraat)

Bestanddeel: Dimethylsulfoxide (DMSO): 968 mg/ml



Doe handschoenen aan



Breng de gel, met het doseerpompje, rechtstreeks aan op het ontstoken gebied (niet inmasseren)



Gebruik 2 maal daags totdat de symptomen verdwijnen, nooit langer dan 12 achtereenvolgende dagen gebruiken

57% van de eigenaren* weet niet dat er ontstekingsremmende gels bestaan

Praktische adviezen om te delen:

- Aanbevolen wachttijd i.v.m. doping: 72 uur
- Niet gebruiken op de geïrriteerde en/of beschadigde huid
- Niet gebruiken met andere plaatstelijke topicals
- Het paard niet afspoeien



* Peiling verricht in juli 2019 door Audevard onder 1225 paardeneigenaren in Europa (FR, DE, NL, UK, BE)