



NEXPECTIN®



- Kan toegediend worden aan **VEULENS** en dragende en zogende **MERRIES**
- **GEMAKKELIJKE TOEDIENING:** korte 8cm doseerspuit



LABORATOIRES
AUDEVARD
Veterinary Expertise & Guarantees

NEXMECTIN®

Ivermectine 18,7 mg/g • Pasta voor oraal gebruik voor paarden



Indicaties voor gebruik

Behandeling van infectie door nematoden of arthropoden als gevolg van:

Grote strongyliden:

- *Strongylus vulgaris* (volwassen en L4 larvale stadia [arterieel])
- *Strongylus edentatus* (volwassen en L4 larvale stadia [weefsel])
- *Strongylus equinus* (volwassen)

Kleine strongyliden (met benzimidazole-resistente stammen):

- *Cyathostomum spp.* (volwassen en lumaal L4 larvale stadia)
- *Cylicocyclus spp.* (volwassen en lumaal L4 larvale stadia)
- *Cylicodontophorus spp.* (volwassen en lumaal L4 larvale stadia)
- *Cylicostephanus spp.* (volwassen en lumaal L4 larvale stadia)
- *Gyalocephalus spp.* (volwassen en lumaal L4 larvale stadia)

Ascarides:

- *Parascaris equorum* (lumaal L5 larvale en volwassen stadia)

Aarswormen:

- *Oxyuris equi* (L4 stage larvae and adults)

Huidnematoden:

- *Onchocerca spp.* (microfilaria)

Horzels:

- *Gasterophilus spp.* (orale en gastrische stadia)

Wachttermijn

(Orgaan)vlees: 34 dagen

Niet toegestaan voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

MA number : REG NL 123111

N°AMM : BE-V538897

Dosering

De schaalverdeling op de doseerspuit is gemarkeerd per 100 kg lichaamsgewicht (op basis van de aanbevolen dosering van 200 µg ivermectine per kg lichaamsgewicht).

De doseerspuit met 7,49 g pasta bevat voldoende pasta om 700 kg lichaamsgewicht te behandelen in de aanbevolen dosering.

Toediening:

De pasta wordt oraal toegediend.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. De mond van het paard mag geen voedsel bevatten om te zorgen dat de pasta wordt doorgeslikt. Stel de schroefmaat op de zuiger van de spuit in op het gewicht van het paard. De punt van de spuit moet in de interdentale ruimte worden geplaatst (de ruimte tussen de voor- en achtertanden) en de pasta moet op de basis van de tong worden aangebracht.

Duw de zuiger zover mogelijk in en breng de pasta aan op de basis van de tong. Houd het hoofd van het paard een paar seconden omhoog om te zorgen dat de pasta wordt ingeslikt.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

Niet gebruiken bij honden en katten, aangezien dit diergeneesmiddel ernstige bijwerkingen kan veroorzaken.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen bekend.

Op diergeneeskundig voorschrift

Verdeler

Audevard, 42-46 rue Médéric, 92110 Clichy (France)